

Piazza Imperatore Tito, 8 Milano (MI)

Tel. 02 55011019

Dal Lunedì al Sabato 9-13 15-19

C.so Porta Vigentina, 23 Milano (MI)

Tel. 02 58324388

Dal Lunedì al Sabato 9-13 / 15-19

Viale Toscana, 46 Rozzano (MI)

Tel. 02 83487242

Dal Lunedì al Venerdì 9-13 14-18

Negozi Online

Tel. 02 400 31 600

Dal Lunedì al Venerdì 09:30-12:30 14:00-17:30



Tutore dinamico scheletrico in carbonio rinforzato e kevlar per piede equino Blue ROCKER 2.0 Tielle

Categoria: Caviglia

Riferimento:

Lâ€™TMextra stabilitÃ , fornita da BlueROCKERÂ 2.0, permetterÃ contemporaneamente un migliore controllo del bilanciamento statico/dinamico di tutto il corpo e della sua postura, garantendo come conseguenza una maggiore sicurezza, specialmente in tutti quei pazienti dove esista una importante insufficienza del quadricipite.Â

Prezzo: 572 €

Descrizione

Caratteristiche

Scocca esterna in resina epossidica. Struttura tibiale ed inserto plantare in carbonio a sezione maggiorata. Struttura plantare in Kevlar

Versione Destra e Sinistra

Misure

	Altezza Supporto Tibiale	Lunghezza Supporto Plantare	Numero Calzatura
XSmall	360mm	210mm	32/35
Small	380 mm	230 mm	35/38
Medium	405 mm	245 mm	38/42
Large	430 mm	270 mm	42/45
XLarge	430 mm	285 mm	oltre 45

Indicazioni

Piazza Imperatore Tito, 8 Milano (MI)

Tel. 02 55011019

Dal Lunedì al Sabato 9-13 15-19

C.so Porta Vigentina, 23 Milano (MI)

Tel. 02 58324388

Dal Lunedì al Sabato 9-13 / 15-19

Viale Toscana, 46 Rozzano (MI)

Tel. 02 83487242

Dal Lunedì al Venerdì 9-13 14-18

Negozi Online

Tel. 02 400 31 600

Dal Lunedì al Venerdì 09:30-12:30 14:00-17:30

- Patologie neurologiche con paralisi flaccida o spastica di importante gravità (Ictus, stiramenti midollari, etc.)
- Patologie neuromuscolari (Sclerosi Multipla, Guillan Barrè, Charcot-Marie-Tooth, distrofia muscolare, etc.)
- Amputazione parziale del piede (interlinea di Chopart)

Consigliato per pazienti con articolazioni della caviglia e della sotto-astragalica instabili e/o con media o grave instabilità dei comparti articolari prossimali (anca ? ginocchio)

Controindicazioni

- Moderati o severi quadri edematosi
- Pazienti diabetici con complicazione di ulcere
- Perdita della sensibilità
- Gravi deformità della cerniera Tibio-astragalo-calcaneare