

Piazza Imperatore Tito, 8 Milano (MI)

Tel. 02 55011019

Dal Lunedì al Sabato 9-13 15-19

C.so Porta Vigentina, 23 Milano (MI)

Tel. 02 58324388

Dal Lunedì al Sabato 9-13 / 15-19

Viale Toscana, 46 Rozzano (MI)

Tel. 02 83487242

Dal Lunedì al Venerdì 9-13 14-18

Negozi Online

Tel. 02 400 31 600

Dal Lunedì al Venerdì 09:30-12:30 14:00-17:30



Tutore dinamico scheletrico in carbonio rinforzato e kevlar per piede equino Blue ROCKER 2.0 Tielle

Categoria: Caviglia

Riferimento:

Lâ€™TMextra stabilitÃ , fornita da BlueROCKERÂ 2.0, permetterÃ contemporaneamente un migliore controllo del bilanciamento statico/dinamico di tutto il corpo e della sua postura, garantendo come conseguenza una maggiore sicurezza, specialmente in tutti quei pazienti dove esista una importante insufficienza del quadricipite.Â

Prezzo: 572 €

Descrizione

Caratteristiche

Scocca esterna in resina epossidica. Struttura tibiale ed inserto plantare in carbonio a sezione maggiorata. Struttura plantare in Kevlar

Versione Destra e Sinistra

Misure

| | Altezza Supporto Tibiale | Lunghezza Supporto Plantare | Numero Calzatura |
|--------|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| XSmall | 360mm | 210mm | 32/35 |
| Small | 380 mm | 230 mm | 35/38 |
| Medium | 405 mm | 245 mm | 38/42 |
| Large | 430 mm | 270 mm | 42/45 |
| XLarge | 430 mm | 285 mm | oltre 45 |

Indicazioni

Piazza Imperatore Tito, 8 Milano (MI)

Tel. 02 55011019

Dal Lunedì al Sabato 9-13 15-19

C.so Porta Vigentina, 23 Milano (MI)

Tel. 02 58324388

Dal Lunedì al Sabato 9-13 / 15-19

Viale Toscana, 46 Rozzano (MI)

Tel. 02 83487242

Dal Lunedì al Venerdì 9-13 14-18

Negozio Online

Tel. 02 400 31 600

Dal Lunedì al Venerdì 09:30-12:30 14:00-17:30

- Patologie neurologiche con paralisi flaccida o spastica di importante gravità (Ictus, stiramenti midollari, etc.)
- Patologie neuromuscolari (Sclerosi Multipla, Guillan Barrè, Charcot-Marie-Tooth, distrofia muscolare, etc.)
- Amputazione parziale del piede (interlinea di Chopart)

Consigliato per pazienti con articolazioni della caviglia e della sotto-astragalica instabili e/o con media o grave instabilità dei comparti articolari prossimali (anca ? ginocchio)

Controindicazioni

- Moderati o severi quadri edematosi
- Pazienti diabetici con complicazione di ulcere
- Perdita della sensibilità
- Gravi deformità della cerniera Tibio-astragalo-calcaneare